

Artigo Original

Open Access

Avaliação do uso de medicamentos em centro de suporte psicossocial em um município de Pernambuco

Thaís Araújo de SANTANA¹, Apache Santiago FERREIRA¹, Sheila Elcielle ARRUDA¹, Aline Silva FERREIRA¹, Emerson de Oliveira SILVA¹, Matheus Alves ANGELOS¹, Pedro Rolim NETO¹, Rosali Maria da SILVA¹

Filiação: ¹Departamento de Ciências Farmacêuticas, UFPE. Recife, PE, Brasil.

Autor Correspondente: Silva RM, rosalitm@gmail.com

Submetido: 28-04-2019 Reapresentado: 04-06-2020 Aceito: 04-07-2020

Revisão por pares: revisores cegos

Resumo

Objective: The objective of this study is to evaluate the profile of medicine usage in a Psychosocial Support Center type II (PSC), in the city of Jaboatão dos Guararapes-PE, Brazil. **Methods:** This is a retrospective cross-sectional descriptive study with a quantitative approach. The information obtained for the study came from the analysis of medical records of patients admitted to the institution from January to August 2015. A total of 157 medical records were analyzed, observing to sociodemographic, clinical and medication use variables. **Results:** There was a predominance of female patients, 57.25% (male 42.75%). Most of the participants were single, with incomplete elementary education, aged between 30-39 years. Most of them had previously been admitted to psychiatric hospitals. From the total number of users who reached the PSC, 60.5% were referred by the Psychosocial Care Network. The most frequent diagnoses, according to the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD), were: schizophrenia, schizotypal disorders and delusional disorders (F20 to F29), and affective mood disorders (F30-F39). It was found that 99.4% of patients used at least 1 medication, which was used twice daily (59.6%). The most prescribed class of drugs was the antipsychotics, mainly chlorpromazine, haloperidol and risperidone. From the total prescribed drugs, 83.3% were in accordance with the Brazilian Common Denomination 85% of them were present in the municipal list of essential drugs and 97% were administered orally. **Conclusion:** The results found in this study were satisfactory. Thus, it was possible to verify that the medicines are great allies in the psychosocial treatment, presenting as a widely-used resource.

Keywords: drug utilization, psychotropic drugs, mental health, drug prescriptions.

Medicine use evaluation in a psychosocial support center in a city of Pernambuco

Abstract

Objetivo: O objetivo desse estudo consiste em avaliar o perfil do uso de medicamentos em um Centro de Apoio Psicossocial tipo II (CAPS), no município de Jaboatão dos Guararapes-PE, Brasil. **Métodos:** Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo, transversal, com abordagem quantitativa. As informações obtidas para o estudo vieram da análise de prontuários dos pacientes internados na instituição, no período de janeiro a agosto de 2015. Foram analisados 157 prontuários, observando às variáveis sociodemográficas, clínicas e uso de medicamentos. **Resultados:** Houve predomínio de pacientes do sexo feminino, 57,25% (sexo masculino 42,75%). A maioria dos participantes eram solteiros, com ensino fundamental incompleto, idade entre 30-39 anos. Maior parte deles já havia sido internado em hospitais psiquiátricos. Do total de usuários que alcançaram o CAPS, 60,5% foram encaminhados pela Rede de Atenção Psicossocial. Os diagnósticos mais frequentes, segundo a código internacional de doenças, foram: esquizofrenia, distúrbios esquizotípicos e transtornos delirantes (F20 a F29) e transtornos afetivos de humor (F30-F39). Verificou-se que 99,4% dos usuários faziam uso de pelo menos 1 medicamento, sendo mais comum a utilização duas vezes ao dia (59,6%) e a classe mais prescrita era a dos antipsicóticos, principalmente, clorpromazina, haloperidol e risperidona. Do total de medicamentos prescritos 83,3% foi de acordo com a Denominação Comum Brasileira, 85% deles estavam presentes na relação municipal de medicamentos essenciais e 97% foram administrados por via oral. **Conclusão:** Os resultados encontrados neste estudo foram satisfatórios, podendo ser confirmado que os medicamentos são grandes aliados no tratamento psicossocial, apresentando-se como um recurso amplamente utilizado.

Palavras-chave: utilização de medicamentos, drogas psicotrópicas, saúde mental, prescrições de medicamentos.

